SILICOSEC®

Protéger ses denrées stockées en toute sérénité

INSECTICIDE POUR LE TRAITEMENT DES LOCAUX ET DES GRAINS STOCKÉS

HAUTEMENT EFFICACE
Sur l'ensemble des insectes du stockage
Pas de résistance connue à ce jour

TERRE DE DIATOMÉES HOMOLOGUÉE
Seule homologation pour un produit phytopharmaceutique à base de terre de diatomées non calcinée amorphe

RÉPOND AUX ENGAGEMENTS DE LA FILIÈRE GRAIN
Solution de biocontôle
Sans résidu

Andermatt

AMM n° 2130129
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement en vigueur
Produit de Biocontrôle inscrit sur la liste Biocontrôle (articles L.253-5 et L.253-7 du code rural).

Composition : 100 % de terre de diatomées (Kieselguhr)

Conditionnement : Sacs de 15 kg

Aucune mention de danger

MODE D'ACTION



Des températures basses, ou une humidité élevée, peuvent retarder l'effet de SilicoSec® de 1 à 2 jours

PRÉPARATION DES LOCAUX VIDES

BONNES PRATIQUES

NETTOYER LES LOCAUX DE STOCKAGE
Dès que la cellule est vide

APPLIQUER SILICOSEC®
Et insister sur fissures, joints, cavités, circuits de manutentions...

ASSURER UN VIDE SANITAIRE
De préférence, d'au moins 4 semaines

MÉTHODES D'APPLICATION

DÉSINSECTISATION DES LOCAUX
Dose : 10g/m²

Avec ventilation

Sans ventilation
Poudreuse, atomiseur, pistolet sablage...

DOSAGE SILICOSEC®

Quantité de SilicoSec® à appliquer selon la capacité de stockage

Cellules verticales			Stockage à plat		
	Capacités	**Dosages**		**Capacités**	**Dosages**
	100 t	≈ 1,5 kg		500 t	≈ 5 kg
	600 t	≈ 5 kg		1 500 t	≈ 12 kg
	1 000 t	≈ 7 kg		3 000 t	≈ 20 kg
	1 500 t	≈ 10 kg		8 000 t	≈ 50 kg
	3 000 t	≈ 15 kg		10 000 t	≈ 60 kg
	5 000 t	≈ 20 kg		30 000 t	≈ 150 kg

Calculer facilement la dose de SilicoSec® à appliquer à l'aide de l'abaque Andermatt :

CONSERVATION DES GRAINS STOCKÉS

BONNES PRATIQUES

RESPECTER LE TAUX D'HUMIDITÉ ET LIMITER LES IMPURETÉS
Lors de la récolte

STOCKER LA COLLECTE
En la séparant de celle de l'année précédente

TRAITER LES GRAINS
Si besoin, selon la méthode la mieux adaptée

VENTILER EN 3 PALIERS
Récolte : 20°C / Sept-Nov : 15°C/ Nov-Janv : 5°C

SURVEILLER
Tout au long du stockage

MÉTHODES D'APPLICATION

Par couches



Superficiel



En plein

Doses : de 0,5kg/t à 2kg/t

Andermatt

CYCLE DU CHARANCON DES GRAINS

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE ET DURÉE DE DÉVELOPPEMENT

Température **15 degrés** (70% h2o)



Cycle complet : **144 jours**

Température **20 degrés** (70% h2o)



Cycle complet : **56,5 jours**

Température **25 degrés** (70% h2o)



Cycle complet : **36,5 jours**

Température **30 degrés** (70% h2o)



Cycle complet : **26 jours**

INSECTES DE STOCKAGE

LES ESPÈCES PRIMAIRES SE DÉVELOPPENT À L'INTÉRIEUR DES GRAINS AVANT L'ÉMERGENCE AU STADE ADULTE

Charançon des grains

Capucin

Charançon du riz

LES ESPÈCES SECONDAIRES SE DÉVELOPPENT À L'EXTÉRIEUR DES GRAINS ET SE NOURRISSENT DE GRAINS CASÉS

Tribolium roux

Silvain dentelé

Teigne des fruits secs

SANS CLASSEMENT

Andermatt

SilicoSec®- Détenteur homologation Biofa AG - Distribution par Andermatt France - Andermatt France est agréée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques - N°6400016 - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi se référer à l'étiquette du produit ou consulter andermatt.fr et/ou ephy.anses. Concentration : 1000g/kg avec plus de 90% de SiO^2 Formulation : Poudre de contact (CP).

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTIONS. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (article 66 du règlement UE 1107/2009).
EPI : PENDANT LES PHASES DE NETTOYAGE, DÉSINSECTISATION ET PROTECTION : SE PROTÉGER EFFICACEMENT AVEC LES EPI RECOMMANDÉS.

Andermatt France - 150 chemin de l'aviation - Bat A - 64200 Bassussarry - Tel : 05-64-11-51-04 - www.andermatt.fr

03-25